

HEU- SCHNUPFEN?

LAUFENDE NASE

GEREIZTE NASE

NIESEN



NEU – JETZT AUCH ALS **FORTE**
MIT 1,5 mg/ml WIRKSTOFFGEHALT


Allergodil akut

Allergodil akut

Die bewährte Produktreihe zur symptomatischen **Behandlung von saisonaler allergischer Rhinitis und Konjunktivitis** wird erweitert:

FORTE Nasenspray mit einzigartiger, patentierter Formulierung*

Der Wirkstoff Azelastin

- ▶ lindert rasch und langanhaltend akute Allergie-Symptome
- ▶ wird zielgenau an den Symptombereichen angewendet
- ▶ bewirkt keine systemische Belastung des Körpers



**NEUE
PATENTIERTE
FORMULIERUNG***
mit 50 % mehr
Wirkstoffgehalt

**Allergodil akut FORTE ist das einzige rezeptfreie,
azelastinhaltige Nasenspray mit 1,5 mg/ml Wirkstoffgehalt****

* Patent-Nr. EP 2486942: Geschützt ist die pharmazeutische Zusammensetzung von Azelastin und Sucralose, wobei die Sucralose den Geschmack des Azelastins maskiert, so dass die Empfindung eines bitteren Geschmacks reduziert wird.
** Quelle: Lauer-Taxe Stand 03.2022

Nasensprays zur Behandlung von allergischer Rhinitis im Vergleich

Alle Angaben wurden den aktuellen Fachinformationen entnommen

Wirkstoff / Wirkstärke	Mometason 0,05% ¹	Levocabastin 0,05% ²	Azelastin 0,1% ³	Azelastin 0,15% ⁴
für Kinder geeignet	⊖ ab 18 Jahre	⊕ ab 1 Jahr	⊕ ab 6 Jahre	⊕ ab 6 Jahre
Dauer der Anwendung	regelmäßig / prophylaktisch	bei akuten Symptomen	bei akuten Symptomen	bei akuten Symptomen
Bei Anwendung	vor Gebrauch schütteln	vor Gebrauch schütteln	sofort einsetzbar	sofort einsetzbar
Dosierung	1 x täglich	2-4 x täglich	2 x täglich	nur 1 x täglich
Wirkeintritt	⊖ nach 12-48 Stunden	in 10-15 Minuten	in 15 Minuten	in 15 Minuten
Wirkdauer	24 Stunden	bis zu 12 Stunden	bis zu 12 Stunden	bis zu 24 Stunden⁵
Haltbarkeit nach Anbruch	2 Monate	3 Monate	6 Monate	6 Monate
Konservierungsmittel	⊖ Benzalkoniumchlorid	⊖ Benzalkoniumchlorid	⊕ keine	⊕ keine
Warnhinweise	⊖ Benzalkoniumchlorid kann eine Reizung oder Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen.	⊖ Benzalkoniumchlorid kann eine Reizung oder Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen. Propylenglycol kann Nasenschleimhautreizungen hervorrufen.	⊕ keine	⊕ keine
Sehr häufige Nebenwirkungen	⊖ Nasenbluten	⊖ Kopfschmerzen	⊕ keine	⊕ keine

**Allergodil® akut FORTE – mit patentierter Formulierung
50 % mehr Wirkstoff + Anwendung nur 1 x täglich = höhere Compliance & Kundenzufriedenheit**

Allergodil akut Das Original vom Wirkstoff-Entwickler


Zur symptomatischen Behandlung von saisonaler allergischer Rhinokonjunktivitis



- ▶ **Mit dem Wirkstoff Azelastin** hochwirksam und bewährt bei Heuschnupfen lindert rasch Allergie-Symptome
- ▶ **Einfache Anwendung** zielgenau an den Symptombereichen
- ▶ **Gute Verträglichkeit** macht nicht müde



WIRKT MINUTENSCHNELL



Allergodil akut Augentropfen

Packungsgröße / Inhalt:
6 ml Lösung
PZN 04095291

Allergodil akut Nasenspray

Packungsgrößen / Inhalt:
5 ml Spray PZN 02218855
10 ml Spray PZN 03436979

Allergodil akut Duo Kombipackung

Packungsgröße / Inhalt:
4 ml Tropfen + 10 ml Spray
PZN 00694793

Allergodil akut FORTE Nasenspray

Packungsgröße / Inhalt:
10 ml Spray
PZN 17510656

1. Fachinformation Mometason-ratiopharm® Heuschnupfenspray, Stand der Information: Dezember 2021, Version 4
2. Fachinformation Livocab® direkt Nasenspray, Stand der Information: März 2013
3. Fachinformation Allergodil® akut Nasenspray, Stand der Information: Februar 2020
4. Fachinformation Allergodil® akut forte Nasenspray, Stand der Information: Dezember 2021
5. Howland et al. Int Forum Allergy Rhinol, 2011

Allergodil® akut forte 1,5 mg/ml Nasenspray, Lösung

Wirkst.: Azelastinhydrochlorid. **Zusammens.:** 1 ml Nasenspray, Lösung enth. 1,5 mg Azelastinhydrochlorid. Ein Sprühstoß (0,14 ml) enth. 0,21 mg Azelastinhydrochlorid entspr. 0,19 mg Azelastin. **Sonst. Bestandt.:** Hypromellose, Sucralose, Sorbitol-Lösung 70%, Natriumedetat, Natriumcitrat, gerein, Wasser. **Anw.:** Augentr.; Behandl. u. Vorbeugung d. Symptome. **Symptomat. Behandl. d. saisonalen allerg. Rhinitis (Heuschnupfen) b. Erwachs., Jugendl. u. Kindern ab 6 J. Gegenanz.:** Überempfindlichk. geg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. **Nebenw.:** Häufig: Dysgeusie (unangenehmer Geschmack). **Gelegentl.:** Reizung d. Nasenschleimhaut (Brennen, Kribbeln), Niesen, Nasenbluten. **Selten:** Schwindelgefühl, Somnolenz (Benommenh., Schläfrigkeit); Übelk.; Abgeschlagenh. (Mattigk., Erschöpfung), Schwächegefühl. **Sehr selten:** Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria. **Warnhinweis:** Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. **Weitere Hinweise in der Fachinformation. Stand:** 12/2021. **Apothekenpflichtig.**

Allergodil® akut Augentropfen. 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung; Allergodil® akut Nasenspray. 1 mg/ml Nasenspray, Lösung. Allergodil® akut Duo. 1 mg/ml Nasenspray, 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösungen

Zusammens.: **Wirkst.:** **Augentropfen:** 1 ml Lösung enth. 0,5 mg Azelastinhydrochlorid (entspr. 0,015 mg/Tropfen). **Nasenspray:** 1 ml Lösung enth. 1 mg Azelastinhydrochlorid (entspr. 0,14 mg/Sprühstoß v. 0,14 ml). **Sonst. Bestandt. m. bek. Wirkung:** **Augentropfen:** 0,125 mg Benzalkoniumchlorid/ml. **Sonst. Bestandt.:** Natriumedetat, Hypromellose. **Augentr. zusätzl.:** Sorbitol-Lösung 70% (kristallisierend), Natriumhydroxid-Lösung 4%, Wasser f. Injekt.-zwecke. **Nasenspray zusätzl.:** Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Citronensäure, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser. **Anw.:** **Augentr.:** Behandl. u. Vorbeugung d. Symptome d. saisonalen allerg. Konjunktivitis b. Erwachsenen u. Kindern ab 4 J. **Behandl. d. Sympt. d. nicht-saisonalen (perennialen) allerg. Konjunktivitis b. Erwachs. u. Kindern ab 12 J. Nasenspray:** Antiallergikum / Antihistaminikum. **Symptomatische Behandl. d. saisonalen allerg. Rhinitis (Heuschnupfen) bei Erw., Jugendl. u. Kindern ab 6 J. Duo:** Symptomat. Behandl. v. allerg. saisonaler Rhinokonjunktivitis (z.B. Heuschnupfen i. Komb. m. allerg. Bindehautentzünd.) b. Erwachs., Jugendl. u. Kindern ab 6 J. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. **Nasenspray/Duo zusätzl.:** Nicht anwenden b: Kindern unter 6 J. **Nebenw.:** **Augentr.:** Häufig: leichte Reizersch. am Auge; **gelegentl.:** bitterer Geschmack; **sehr selten:** allerg. Reakt. **Nasenspray:** Häufig: bitterer Geschmack, (meist aufgr. unsachgemäßer Anw.), der zuweilen Übelk. verursachen kann); **gelegentl.:** Reizung d. bereits entzündlich veränd. Nasenschleimhaut (Brennen, Kribbeln), Niesen, Nasenbluten. **Selten:** Übelk.; **sehr selten:** Überempfindlichk.-reaktionen; Schwindel, Somnolenz (Benommenh., Schläfrigkeit); Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht; Abgeschlagenheit (Mattigkeit, Erschöpfung), Schwindel- od. Schwächegefühl, die auch durch das Krankheitsgeschehen selbst bedingt sein können. **Weitere Hinweise siehe Fachinformation. Apothekenpflichtig. Stand:** Augentropfen September 2018, Nasenspray Februar 2020, Allergodil akut Duo September 2020

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg

© 2022 Mylan Germany GmbH (A Viatris Company), Benzstraße 1, 61351 Bad Homburg

